

Een vergelijkingsmonster wordt gebruikt wanneer het bodemvoedselweb van verschillende situaties met elkaar vergeleken moeten worden.

A. Altijd beginnen met een duidelijke vraag

Voorbeelden:

- *Waarom presteert mijn gewas in bed A slecht en in bed B goed?*
- *Wat is het verschil tussen een gangbaar en regeneratief perceel?*
- *Waarom is de onkruiddruk op één plek hoger dan in de rest van het perceel?*

De vraag bepaalt welke situaties worden bemonsterd.

B. Monsters altijd strikt gescheiden houden

- Situatie A → zipbag A
- Situatie B → zipbag B
- Enz.

C. Bepaal de juiste bemonstermethode

- Wanneer er gewassen staan, [volg het Wortelzone-monster protocol](#).
- Wanneer er geen gewassen staan, [volg het Perceelmonster protocol](#).
- Kies in elke situatie een representatief deel, geen sterk afwijkende situatie t.o.v. wat je wil bemonsteren.

D. Fotomateriaal (aanbevolen)

Maak per situatie:

- Een overzichtsfoto, bij voorkeur waarin het verschil tussen de situaties zichtbaar is.
- Een close-up van het volledige gewas (indien aanwezig)
- Mail ze naar info@soiltherapy.nl met vermelding van onderstaande label info.

E. Label de zipbags

Noteer aan de buitenzijde:

- Type monster (perceel/wortelzone/vergelijking/compost)
- Naam teler (eventueel)
- Naam locatie/perceel
- Doelgewas
- Naam monsternemer
- Datum monstername

Neem bodemonsters alleen bij normaal vochtige omstandigheden (geen droogteperiode of hittegolf) en bij voorkeur bij een bodemtemperatuur boven de 6 graden Celsius. Bewaar monsters uit direct zonlicht en op dezelfde omgevingstemperatuur als op het moment van steken.